

Entrevista de triage CRAFFT 2.0 versão para Portugal

Para ser administrado oralmente pelo clínico

Comece: “Agora vou fazer algumas perguntas que sempre faço para todos os meus pacientes. Por favor, responda com sinceridade; vou manter suas respostas em sigilo.”

Parte A

Nos últimos 12 MESES, quantos dias você:

1. Bebeu qualquer bebida alcoólica tais como cerveja, cachaça, vodka, vinho (mais do que uns goles)? Coloque "0" se não usou.
Quantos dias
2. Fumou maconha (marijuana, haxixe) ou maconha sintética tais como “K2” ou “Spice”? Coloque "0" se não usou.
Quantos dias
3. Usou qualquer outra coisa para ficar alto/louco/chapado (“outra coisa” inclui drogas ilegais, remédios com receita médica ou inalantes)? Coloque "0" se não usou.
Quantos dias

Seu paciente respondeu “0” para todas as perguntas na Parte A?

Sim



Não



Faça a pergunta do CARRO apenas

Faça todas as 6 perguntas do CRAFFT*

Parte B

Não

Sim

- | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| C | Você já andou num <u>CARRO</u> conduzido por alguém (inclusive você) que estava alto, que tivesse bebido álcool ou consumido droga? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| R | Você já bebeu ou consumiu droga para <u>RELAXAR</u> , sentir-se melhor ou para se enturmar? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A | Você já bebeu ou consumiu droga quando estava <u>SOZINHO/A</u> ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F | Você já <u>ESQUECEU</u> coisas que fez quando tinha bebido ou consumido droga? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F | Sua <u>FAMÍLIA</u> ou <u>AMIGOS</u> já lhe disseram para você beber menos ou consumir menos droga? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| T | Você já se <u>ENVOLVEU</u> em <u>PROBLEMA</u> enquanto estava bebendo ou consumido droga? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


***Duas ou mais respostas positivas sugere problema grave e precisa de melhor avaliação. Veja no verso para mais instruções** →

NOTA PARA O CORPO CLÍNICO E PRONTUÁRIO MÉDICO:

As informações registradas nesta página podem estar protegidas por leis federais americanas especiais que regulam confidencialidade (42 CFR Part 2), que proíbe a divulgação destas informações a menos que haja consentimento expreso e por escrito. Uma autorização simples para liberação de informações médicas NÃO é suficiente.

1. Mostre para o seu paciente o escore dele/dela no gráfico e converse sobre o nível de risco para transtornos por uso de substância.

Probabilidade de Transtorno de uso de substância pelo escore CRAFFT



*Fonte de dados: Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O'Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. (2014). The CRAFFT cut-points and DSM-5 criteria for alcohol and other drugs: a reevaluation and reexamination. Substance Abuse, 35(4), 376–80.

2. Pontos de abordagem para aconselhamento clínico



1. REVEJA os resultados da avaliação

Para cada resposta com “sim”: *“Você pode me falar um pouco mais sobre isso?”*



2. RECOMENDE o não uso

“Minha recomendação como seu médico é você não usar nada de álcool, nenhuma maconha ou outras drogas porque elas podem: 1) Causar danos para seu cérebro em desenvolvimento; 2) Interferir com seu aprendizado e memória, e 3) Pôr você em situações constrangedoras e perigosas”.



3. PEGAR CARONA/DIRIGIR o aconselhamento de risco.

“Acidentes de trânsito são as principais causas de morte de jovens. Eu dou a todos os meus pacientes o Contrato pela vida. Leve para sua casa e converse com seus pais/responsáveis para criar um plano de carona seguro.”



4. INDUZIR: Estimule declarações auto motivadoras

Não usuários: *“Se alguém perguntasse por que você não bebe ou usa drogas, o que você diria?”* Usuários: *“Quais seriam algumas das vantagens de não usar?”*



5. REFORCE auto eficácia

“Você tem tanto potencial. Eu ficaria muito chateado/a de ver o álcool ou as drogas atrapalharem a realização de seus sonhos futuros.”

3. Dê ao paciente Contracto pela Vida (<http://www.sadd.org/contract.htm#cfli>).

© John R. Knight, MD, Boston Children's Hospital, 2016.

Reproduzido com permissão do Center for Adolescent Substance Abuse Research (CeASAR), Boston Children's Hospital.
Para mais informações e versões em outros idiomas, acesse www.ceasar.org

(617) 355-5433.