

CRAFFT 2.1+N 调查问卷

由医师口头操作

开始：“我将向你提出以下问题，这些问题我也问到其他所有病人。请你如实作答。我将对你的作答情况保密。”

第一部分

在过去的 12 个月中，你有多少天：

1. 喝过（而不仅仅指浅尝几小口）啤酒、葡萄酒，或任何含酒精饮料？如果没有喝过，填“0”。 天数
2. 是否使用任何大麻（大麻、烟油、烟膏、香烟、电子烟、高纯度大麻提取物或大麻食品）或“合成大麻”（例如，“K2”或“香料”）？如果没有使用过，填“0”。 天数
3. 是否服用不是为您开具的处方药或者药片，或服用多于为您开具的用量的药物（例如，药品，处方止痛药或 ADHD 药物）？如果没有服用过，填“0”。 天数
4. 使用含尼古丁和/或味道的电子烟设备*，或使用任何烟草制品†？*例如电子烟、盒式电子烟、JUUL 等小型电子烟、Puff Bar 等一次性电子烟、笔式电子烟或电子水烟。†香烟、雪茄、小雪茄、水烟、咀嚼烟草、鼻烟、瑞典口含烟、烟溶液或尼古丁袋。 天数

如果患者……

对 A 部分所有问题的答案都是“0”



只询问下方 B 部分中的第 1 题，然后停止问诊

在第 1、2 或 3 题中回答“1”或更大的数字



询问下方 B 部分中的所有 6 道问题

第 4 题回答“1”或更大的数字



询问下一页 C 部分中的所有 10 道问题

第二部分

圈选题

- | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|---|
| C | 你是否乘坐过驾驶人（包括你本人）在亢奋状态下、饮酒后或吸毒后驾驶的汽车？ | 否 | 是 |
| R | 你是否使用过酒精或毒品来放松自己，提升自我感觉，或适应所在社群？ | 否 | 是 |
| A | 你是否曾在孤身一人的情况下饮过酒或使用过毒品？ | 否 | 是 |
| F | 你是否曾在饮酒时或使用毒品时忘记自己过去做的事情？ | 否 | 是 |
| F | 你的家人或朋友是否劝说过你应该节制饮酒或减少使用毒品？ | 否 | 是 |
| T | 你是否在喝酒或使用毒品时招惹过麻烦？ | 否 | 是 |

*两个或多于两个问题的作答为“是”即表明问题严重，有必要进一步评估。详见背后 →

诊所工作人员与医疗记录注意：

本页所记录的信息受联邦特别保密条款（美国联邦法规（CFR）第 42 章第 2

部分）保护。除非获得特定的书面授权同意，否则根据保密条款本信息禁止公开。一般性的关于公开医疗信息的授权书不足以允许本信息公开。

下列问题旨在了解您对任何含尼古丁和/或味道的电子烟设备或任何烟草制品*的使用情。
请为每道问题圈选答案。

第三部分

圈选题

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. 是否曾尝试戒除使用相关设备或制品，但却没能成功？ | 是 | 否 |
| 2. 是否由于很难戒掉而仍在吸电子烟或使用烟草制品？ | 是 | 否 |
| 3. 是否曾觉得自己对电子烟或烟草成瘾？ | 是 | 否 |
| 4. 是否曾极度渴望吸电子烟或使用烟草制品？ | 是 | 否 |
| 5. 是否曾觉得自己十分需要吸电子烟或使用烟草制品？ | 是 | 否 |
| 6. 在学校等禁烟场所，是否很难抵抗吸电子烟或使用烟草制品的欲望？ | 是 | 否 |
| 7. 当有一会儿没吸电子烟或使用烟草制品（或当尝试戒除）时…… | | |
| a. 是否因为不能吸电子烟或使用烟草制品，而很难集中注意力？ | 是 | 否 |
| b. 是否因为不能吸电子烟或使用烟草制品，而变得易怒？ | 是 | 否 |
| c. 是否强烈地需要或想要吸电子烟或使用烟草制品？ | 是 | 否 |
| d. 是否因为不能吸电子烟或使用烟草制品，而感到紧张、不安或焦虑？ | 是 | 否 |

一个或多个“是的”回答表明严重依赖尼古丁，需要进一步评估 →

**参考资料*

Wheeler, K. C., Fletcher, K. E., Wellman, R. J., & DiFranza, J. R. (2004). Screening adolescents for nicotine dependence: the Hooked On Nicotine Checklist. *J Adolesc Health, 35*(3), 225–230;


McKelvey, K., Baiocchi, M., & Halpern-Felsher, B. (2018). Adolescents' and Young Adults' Use and Perceptions of Pod-Based Electronic Cigarettes. *JAMA Network Open, 1*(6), e183535.

NOTICE TO CLINIC STAFF AND MEDICAL RECORDS:

The information on this page is protected by special federal confidentiality rules (42 CFR Part 2), which prohibit disclosure of this information unless authorized by specific written consent.

CRAFFT 评分解读

根据 CRAFFT 评分显示，可能存在 DSM-5 定义的物质使用障碍



*数据来源: Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O'Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. (2014). The CRAFFT cut-points and DSM-5 criteria for alcohol and other drugs: a reevaluation and reexamination. Substance Abuse, 35(4), 376-80.

利用以下提纲提供简短的辅导。



1. 评估筛查结果

对每一个“是”的作答：“请你多告诉我一些情况好吗？”



2. 劝其不要滥用物质

“作为你的医生（护士/健保机构），我劝你不要使用任何酒精、大麻或其它任何毒品，因为这些东西会：1) 对发育中的大脑有害；2) 干扰学习和记忆，以及 3) 将你置于尴尬或危险的处境中。”



3. 乘车/驾车风险建议

“机动车车祸是年轻人死亡的首要原因。我会给所有病人一份《生命合同》。请将此合同带回家与你的父母/监护人一起制定安全驾乘回家的计划。”



4. 诱导他人提供激励自己的回答

非物质滥用者：“如果有人问你为什么不喝酒或使用毒品，你会说些什么？” 物质滥用者：“不滥用物质都有哪些好处？”



5. 强调自我效能

“我相信你一定有能力做到不让酗酒或吸毒行为阻碍自己实现个人目标。”

给病人《生命合同》。见网站 www.crafft.org/contract

© John R. Knight, MD, Boston Children's Hospital, 2020.

Reproduced with permission from the Center for Adolescent Behavioral Health Research (CABHRe), Boston Children's Hospital. For more information and versions in other languages, see www.crafft.org.